



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰/۸۹۴۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: در خصوص واکسیناسیون مادران باردار تا ۴۲ روز پس از زایمان پیرو نامه شماره ۳۰۰/۸۶۷۰ مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (پاسخ به سئوالات)

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۳۰۰/۸۶۷۰ مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۰ در خصوص واکسیناسیون مادران باردار تا ۴۲ روز پس از زایمان با توجه به سئوالات مکرر همکاران نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱. در واکسیناسیون زنان در سنین باروری، نیازی به آزمایش بارداری قبل از واکسیناسیون و تعویق اقدام برای بارداری نمی باشد.

۲. در صورت وقوع بارداری در هر زمانی مطابق دستور عمل فوق، اقدام شود.

۳. مفاد نامه شماره ۳۰۰/۸۶۷۰ مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ شامل حال مادران باردار تا ۴۲ روز پس از زایمان واجد شرایط می باشد، بدیهی است بعد از این دوره زمانی (از روز ۴۳ پس از زایمان به بعد) شرایط واکسیناسیون در شیردهی مطابق نامه شماره ۳۰۲/۴۱۳۹ مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

۴. مشاوره برای واکسیناسیون مادران باردار لازم است، اما مطابق نامه ۳۰۰/۴۳۲۸ مورخ ۱۲ خرداد ماه سال جاری، در صورت تایید لزوم تجویز واکسن آسترانیکا در بارداری توسط کمیته دانشگاهی، اخذ رضایت نامه کتبی از این گروه مادران (موارد تزریق واکسن آسترانیکا) الزامی است.

۵. مادران باردار با هر شرایط برای واکسیناسیون بایستی در سامانه های سلامت ثبت شوند. برای مادران بخش خصوصی، جهت صدور مجوز واکسیناسیون حداقل ثبت یک بار مراقبت در سامانه های سلامت ضروری است.

۶. نوع بیماری زمینه ای مادر بر اساس مستندات، در سامانه های سلامت ثبت گردد.

۷. در صورت واکسیناسیون، ثبت اطلاعات لازم در سامانه پورتال سلامت مادران به آدرس www.health.gov.ir دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت مادران، ستون لیست ها واکسیناسیون مادران باردار، الزامی است.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰/۸۹۴۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

۸. در حال حاضر واکسیناسیون مادران باردار در گروه سنی ۱۸-۳۵ سال محدود به شرایط اعلام شده در نامه ۳۰۰/۸۶۷۰ مورخ ۱۶ مرداد ماه (وجود بیماریهای زمینه یا BMI مساوی یا بیشتر از ۳۵ یا داشتن همسر شاغل در ارتباط با بیماران مشکوک یا مبتلا به کووید در بهداشت و درمان) و گروه های هدف فعلی واکسیناسیون کووید ۱۹ مطابق دستور عمل کشوری واکسن می باشد.

۹. در حال حاضر واکسن های اعلام شده برای تزریق در بارداری، در سن کمتر از ۱۸ سال مجاز تجوز ندارند.

۱۰. همانطور که در نامه ۳۰۰/۸۶۷۰ مورخ ۱۶ مرداد ماه تاکید شده، در مادران واجد شرایط در سن بارداری ۲۸ هفته و بالاتر (سه ماهه سوم) اولویت دریافت واکسن هستند، اما لازم است که برای پیشگیری از فوت وقت، هم زمان برای واکسیناسیون مادران باردار با سن بارداری ۱۲ تا ۲۸ هفته نیز برنامه ریزی های لازم به صورت نزولی از نظر سن بارداری (از ۲۸ هفته به پایین) به عمل آید.

۱۱. اطلاع رسانی به مادران برای واکسیناسیون به عهده دانشگاه است. این مهم می تواند از طریق هماهنگی با صدا و سیما محلی و نظام پزشکی شهرستانها و همکاران فعال در سامانه ۴۰۳۰ مادران انجام شود.

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت