

رویکرد به اسهال و کم آبی در کودکان بر اساس برنامه مانا

دکتر بهار الله وردی
مرکز طبی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران



مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال «مانا»

پزشک



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرستیز
سازمان بهداشتی
دفتر سلامت جمعیت، خانوار و مدارس
اداره سلامت کودکان



وزارت بهداشت، امنیت اجتماعی و امور مردم
سازمان امنیت اجتماعی و امور مردم
کمیته امنیت اجتماعی و امور مردم

هوالشافی

مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا) پزشک

علام خطر فوری

ارزیابی علام خطر فوری
نحوه باز کردن راه هوایی
تنفس گمکی / ماساژ قلبی / نحوه دادن اکسیژن

ارزیابی، طبقه بندی و درمان کودک بیمار ۲ ماهه تا ۵ ساله

ارزیابی نشانه های خطر
سرمه یا تنفس مشکل
اسهال و کم آبی
تب
مشکل گوش / گلودرد
کم وزنی / واکسیناسیون / مکمل یاری

تشخیص افتراقی ها
کاهش سطح هوشیاری - سرفه یا تنفس مشکل - تب

درمان
اقدامات لازم تا قبل از انتقال یا ارجاع فوری
درمان کم آبی
درمان بیماری ها

پیگیری کودک
پنومونی - اسهال خونی - عفونت گوش
اسهال - تب - گلو درد - مشکلات تنفسی و رشد کودک - کم وزنی

مشاوره با مادر

غذا و نحوه تقدیمه
توصیه های تقدیمه ای در بیماری

چه موقع مراججه کنند؟
مسعمیت با مواد مخدner

ارزیابی، طبقه بندی و درمان کودک مصدوم

نحوه وضعیت دادن به کودک بیهوش / مایع درمانی وریدی
نحوه درمان تشنج / گلوكز وریدی
آرزویابی، طبقه بندی و درمان شیرخوار بیمار کمتر از ۲ ماه
عفونت باکتریال
زردی
اسهال و کم آبی
مشکل شیرخورد و کم وزنی - این سازی - مکمل ها - سایر مشکلات
درمان شیرخوار بیمار کمتر از ۲ ماه
احیای نوزاد
باز کردن راه هوایی
نحوه دادن اکسیژن
پیشگیری از اتفاق حرارت
پیشگیری از بایان آبدن قند خون - درمان تشنج
درمان های قبل از انتقال و ارجاع فوری
نمودار ارزیابی زردی (بوتانی)
مشاوره با مادر شیرخوار بیمار کمتر از ۲ ماه
ظرف صحیح بغل کردن و پستان گرفتن - چه موقع برگردان
پیگیری شیرخوار بیمار کمتر از ۲ ماه
زردی - کم آبی - عفونت باکتریال - یرفک - وزن گیری ناکافی

مارگزیدگی
گزش حشرات - عقرب / رتیل
درمان اختصاصی سوختگی ها و سرمادگی
اقدامات تکمیلی و پیگیری سوختگی

۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۷-۱۸
۱۹
۲۰-۲۲
۲۳-۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱-۳۳
۳۴
۵۲
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷

نحوه باز کردن راه هوایی
تنفس گمکی / ماساژ قلبی / نحوه دادن اکسیژن
ارزیابی نشانه های خطر
سرمه یا تنفس مشکل
اسهال و کم آبی
تب
مشکل گوش / گلودرد
کم وزنی / واکسیناسیون / مکمل یاری
کاهش سطح هوشیاری - سرفه یا تنفس مشکل - تب
درمان
اقدامات لازم تا قبل از انتقال یا ارجاع فوری
درمان کم آبی
درمان بیماری ها
پیگیری کودک
پنومونی - اسهال خونی - عفونت گوش
اسهال - تب - گلو درد - مشکلات تنفسی و رشد کودک - کم وزنی
مشاوره با مادر
غذا و نحوه تقدیمه
توصیه های تقدیمه ای در بیماری
چه موقع مراججه کنند؟
مسعمیت با مواد مخدner

طبقه بندی	علائم و نشانه ها
کم آسی شدید	<ul style="list-style-type: none"> ۲ نشانه از نشانه های زیر را دارا باشد: خواب آلودگی غیرعادی با اختلال هوشیاری فلوروفلگی چشم ها عدم توانایی نوشیدن یا سخت نوشیدن در نیشگون بوسی، بوسی خیلی آهسته به حال طبیعی بر می گردد.
کم آسی نیز	<ul style="list-style-type: none"> ۲ نشانه از نشانه های زیر را دارا باشد: بی قراری و تحریک پذیری فلوروفلگی چشم ها تشنه است و با وضع می نوشد. در نیشگون بوسی، بوسی آهسته به حال طبیعی بر می گردد.
کم آسی ندارد	<ul style="list-style-type: none"> نشانه های کالی برای طبقه بندی کم آسی شدید یا نیز وجود ندارد.
اسهال پایدار شدید	<ul style="list-style-type: none"> در صورت وجود هر یک از علایم زیر: کم آسی دارد من ۲ تا ۴ ماه سوء تغذیه شدید
اسهال پایدار	<ul style="list-style-type: none"> نشانه های کم آسی ندارد.
اسهال خوبی	<ul style="list-style-type: none"> در صورت درد لیزیودیک شکریه همراه خون در مدفوع



اسهال و کم آسی را ارزیابی کنید.

- مشاهده و بررسی کنید:**
- سوال کنید:**
- برای چه مدتی و چند بار دفع مدفع خون در مدفوع وجود دارد.
 - آیا خون در مدفوع داشته است؟
 - خواب آلودگی غیرعادی با اختلال هوشیاری
 - بی قراری و تحریک پذیری
 - فلوروفلگی چشم ها
 - که کودک مایعات بدھیده
 - عدم توانایی نوشیدن یا سخت نوشیدن
 - تشنه است و با وضع می نوشد.
- پوست شکم را بین دو انگشت پشتارید:
- خیلی آهسته به حالت طبیعی بر می گردد
 - (بیش از ۲ ثانیه)
 - آهسته به حالت طبیعی بر می گردد.
- در صورت وجود خون در مدفوع و درد اپیزودیک شکم، به احتمال وجود آوازینهای تووجه کنید.


- در موارد اسهال پایدار مقاوم به درمان، جهت بررسی بیشتر از نظر نقص ایمنی (نقص ایمنی اولیه، ایدز و...) به صفحه ویژه ارزیابی HIV و راهنمای بوكلت مراجعه شود.
- در اغلب موارد، خون واضح در مدفوع همراه با تب، استفراغ و درد شکم می باشد.

علائم و نشانه ها	طبقه بندی	تشخیص نوع درمان
<ul style="list-style-type: none"> ۲ نشانه از نشانه های زیر را دارا باشد: • خواب آلودگی غیرعادی یا اختلال هوشیاری • فرورفتگی چشم ها • عدم توانایی نوشیدن یا سخت نوشیدن • در نیشگون پوستی، پوست خیلی آهسته به حال طبیعی بر می گردد. 	<p>کم آبی شدید</p>	<ul style="list-style-type: none"> • اگر کودک در طبقه بندی شدید دیگری نیز قرار می گیرد، کودک راهنمراه مادرش انتقال دهید و در صورت توانایی نوشیدن در بین راه او. آس جرعه جرعه به او بخورانید و به مادر توصیه کنید تغذیه با شیر مادر را ادامه دهد. • اگر کودک در طبقه بندی شدید دیگری قرار نمی گیرد، برای درمان کم آبی، غذا و مایعات را طبق برنامه درمانی (ج) بدھید. • توصیه های تغذیه ای، ارزیابی واکسیناسیون و مکمل های دارویی انجام شود. • اگر سن کودک ۲ سال یا بیشتر است و وبا شیوع دارد، آنتی بیوتیک مناسب برای وبا بدھید.

درمان کم آبی / برنامه درمانی ج: درمان سریع کم آبی شدید

اگر کودک قادر به نوشیدن است در حین استفاده از مایعات وریدی به او از راه دهان او.آ.اس بدهید. $kg/100ml$ محلول رینگرلاکات (یا اگر قابل دسترس نیست، نرمال سالین) طبق جدول زیر تزریق کنید:

سپس kg/kg در	ابتداء ml/kg در	سن
۵ ساعت	۱ ساعت	شیرخواران زیر ۱۲ ماه
۲/۵ ساعت	۳۰ دقیقه	کودکان ۱۲ ماه تا ۵ سال



- کودک را هر ۱ تا ۲ ساعت مجدداً ارزیابی کنید.
- اگر وضع آب بدن کودک بهتر نشده است سرعت تزریق وریدی را افزایش دهید.
- به محض این که کودک بتواند بنوشد (معمولًا بعد از ۴-۳ ساعت در کودکان بزرگتر) به او محلول او.آ.اس (حدود $kg/100ml$) هم بدهید.




- کودک را بی درنگ برای درمان وریدی انتقال دهید.
- اگر کودک قادر به نوشیدن است به مادر نشان دهید، چگونه در راه، محلول او.آ.اس را به کودک بدهد.
- بعد از ۶ ساعت مجدداً کودک را ارزیابی کرده و برنامه درمانی مناسب (الف، ب، یا ج) را انتخاب کنید.



- درمان کم آبی را با دادن محلول او.آ.اس از طریق خوراکی یا لوله معده (NGT) شروع کنید.
- در هر ساعت $kg/100ml$ محلول او.آ.اس برای مدت ۶ ساعت بدهید (مجموعاً $1200ml$).



- اگر کودک استفراغ مکرر داشته باشد یا نفخ شکم زیادتر شود، مایعات را با سرعت کمتری به او بدهید.
- اگر کم آبی بعد از ۳ ساعت بهتر نشد، کودک را برای تزریق وریدی انتقال دهید.
- بعد از ۶ ساعت مجدداً کودک را ارزیابی کرده و برنامه درمانی مناسب (الف، ب، یا ج) را انتخاب کنید.



- اگر نمی توانید برای درمان کم آبی از لوله معده N.G.T استفاده کنید و کودک قادر به نوشیدن نیست، کودک را برای درمان وریدی انتقال دهید.
- توجه: در صورت امکان حداقل ۶ ساعت پس از جبران کم آبی، کودک را تحت نظر داشته باشید تا مطمئن شوید که مادر می تواند با دادن محلول او.آ.اس از طریق دهان، کم آبی را جبران کند.

۲ نشانه از نشانه های زیر را دارا باشد:

• بی قراری و تحریک پذیری

• فرورفتگی چشم ها

• تشنه است و باولع می نوشد.

• در نیشگون پوستی، پوست آهسته به حال طبیعی برمی گردد.

کم آبی

نسبی

- اگر کودک در طبقه بندی شدید دیگری قرار می گیرد، کودک راه همراه مادرش انتقال دهید و در صورت توانایی نوشیدن در بین راه او. آرس جرعة جرعة به او بخورانید و به مادر توصیه کنید تغذیه با شیر مادر را ادامه دهد.
- برای درمان کم آبی، مایعات، روی (Zinc) و غذا را طبق برنامه درمانی (ب) بدھید.
- توصیه های تغذیه ای، ارزیابی واکسیناسیون و مکمل های دارویی انجام شود.
- به مادر توصیه کنید که چه زمانی فوراً برگردد.
- در صورت عدم بہبودی، ۵ روز بعد مراجعه کند.

اگر مادر باید قل از انعام برنامه درمان (ب) مرکز بهداشتی درمانی را نزک کند

- به مادر طرز تهیه او.آرس رانشان بدھید.
- به مادر راشان بدھید که برای تکمیل دوره درمان ۴ ساعته چه مقدار او.آرس باید در منزل به کودک بدهد.
- برای جیران کم آنی به طور کامل، تعداد کافی پودرا او.آرس به اندازه مصرف دو روزه به مادر بدھید.

چهار قانون درمان اسماں در منزل را برای او شرح دهد

۱. مایعات اضافی بدھید: (هر قدر که کودک بخواهد)
۲. مکمل روی را روزانه ۱۰۰ میلی گرم در سن کمتر از ۶ ماه و ۲۰۰ میلی گرم در سنین بالاتر) به مدت ۱۰-۱۴ روز تجویز کنید.
۳. بر تداوم تغذیه تأکید کنید (در سن کمتر از ۶ ماه، تقدیه انحصاری با شیر مادر و در بقیه سنین شیرخوارگی، هر مقدار که کودک میل دارد با شیر مادر تغذیه کند).
۴. به مادر بگویید چه موقع برای ارزیابی مجدد و چه موقع فوراً برگرداد.

درمان کم آبی / برنامه درمانی ب: درمان کم آبی نسبی

- برای ۴ ساعت در مرکز بهداشتی درمان او.آرس (هیبواسمولار) به کودک خورانده شود.**
تعیین مقدار تقریبی محلول او.آرس که باید در ۴ ساعت اول داده شود.

سن*	کمتر از ۴ ماه	۴ تا ۱۲ ماه	۱۲ تا ۲۴ ماه	۲ تا ۵ سال
وزن	۶Kg	۶-۱۰Kg	۱۰-۱۲Kg	۱۲-۱۹Kg
میلی لیتر	۴۵۰ تا ۲۰۰	۸۰۰ تا ۴۵۰	۸۰۰ تا ۹۶۰	۹۶۰ تا ۱۶۰۰

- از سن کودک زمانی استفاده کنید که وزن او را نمی دانید. برای محاسبه مقدار تقریبی او.آرس می توانید وزن کودک (بر حسب kg) را در ۷۵ ضرب کنید.
- هر چقدر کودک میل دارد، او.آرس به او بدهید.
- برای شیرخواران زیر ۶ ماه که تغذیه انحصاری با شیر مادر ندارند، در طول این مدت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر آب تمیز هم بدهید.

به مادر نشان دهد که چگونه او.آرس به کودک بدهد:

- مرتباً با فنجان یا قاشق و جرمه جرمه بدهد.
- اگر کودک استفراغ کرد ۱۰ دقیقه صبر کند و پس از آن دادن او.آرس را کم کم ادامه دهد.
- هر مقدار که کودک میل دارد با شیر مادر تغذیه کند.

بعد از ۴ ساعت

- کودک را ارزیابی مجدد و کم آبی او را طبقه بندی نمایید.
- برای ادامه درمان، برنامه درمانی مناسب را انتخاب کنید.
- تغذیه کودک را در مرکز بهداشتی درمانی شروع کنید.

نیازهای کافی برای طبقه‌بندی کم آبی شدید پانسی و وجود ندارد.

- برای درمان اسهال در منزل مایعات، روی (Zinc) و غذاراطیق برنامه درمانی الف انجام دهید.
- توصیه‌های تغذیه‌ای، ارزیابی واکسیناسیون و مکمل‌های دارویی انجام شود.
- به مادر توصیه کنید که چه زمانی فوراً برگردد.
- در صورت عدم بهبودی، ۵ روز بعد مراجعه کند.

درمان کم آبی / برنامه درمانی الف: درمان اسهال در منزل

مشاوره با مادر درباره ۳ قانون درمان اسهال در منزل

(دادن مایعات اضافی، مکمل روی روزانه، ادامه تغذیه، چه موقع برگردان)

۱. مایعات اضافی بدهید: (هر قدر که کودک بخواهد)

• شیرخوار را مکرراً با دفعات بیشتر از قبل و طولانی تر در هر نوبت با شیر خود تقدیه کنند.

• اگر شیرخوار انحصاراً شیر مادر می خورد، علاوه بر شیر مادر به او، او.آر.اس (هیبو اسمولار) بدهد.

• اگر کودک شیر مادر خوار نمیست، علاوه بر شیر مصنوعی به او آب جوشیده خنک یا او.آر.اس (هیبو اسمولار) هم بدهد.

• در صورت شروع تقدیه کمکی برای کودک، لذت‌های آبکی (مانند: سوپ، ماست و دوغ) داده شود.

• از مایعات خیلی شیرین مثل نوشابه و آب میوه استفاده نشود.

• برحسب سن کودک هر مقدار مایعی که کودک بخواهد تا زمانی که اسهال متوقف گردد، به او بدهد.

• به مادر نشان بدهید که او.آر.اس را جکونه و یا چه مقدار آب محلول کند.

• به مادر نشان بدهید چه مقدار او.آر.اس را پس از هر بار دفع آبکی به او بدهد:

- در شیرخوار زیز ۶ ماه، ۱۰ میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به ازاء هر بار احیات مراج آبکی

- در کودک کمتر از ۲ سال یا بیشتر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر پس از هر بار دفع مدفع

او.آر.اس برای مصرف ۲ روزه مادر بدهید.

• محلول او.آر.اس را با فنجان یا قاشق مرتبأ جرعه جرعه بدهد.

• اگر کودک استفراغ کرد ۱ دقیقه صبر کند، سپس محلول را آهسته تر ادامه دهد.

• تازمان قطع اسهال دادن مایعات اضافه را ادامه دهد.

۲. مکمل روی را روزانه ۱۰ میلی گرم در سن کمتر از ۶ ماه و ۲۰ میلی گرم در سنین بالاتر به مدت ۱۰-۱۴ روز تجوییز کنید.

۳. بر تداوم تقدیه تأکید کنید. به توصیه های تقدیه ای مراجعه شود. در سن کمتر از ۶ ماه، به تقدیه انحصاری با شیر مادر تأکید شود.

۴. به مادر بگویید چه موقع برای ارزیابی مجدد و چه موقع فوراً برگردان.

اسهال
پایدار
۱۴ روز یا
بیشتر

در صورت وجود هر یک از علایم زیر:

- کم آبی دارد
- سن ۲ تا ۴ ماه
- سوء تغذیه شدید

<p>اسهال پایدار شدید</p> <ul style="list-style-type: none">• اقدامات درمانی را طبق طبقه بندی کم آبی شروع کنید.• اگر کودک در طبقه بندی شدید دیگری فارمی گیرد انتقال، در غیر این صورت کودک رافوراً ارجاع دهید.		
<p>اسهال پایدار</p> <ul style="list-style-type: none">• به مادر در مورد تغذیه کودک مبتلا به اسهال پایدار توصیه کنید.• مولتی ویتامین و میترال شامل روی به مدت ۱۴ روز تجویز کنید.• توصیه های تغذیه ای، ارزیابی واکسیناسیون و مکمل های دارویی انجام شود.• به مادر توصیه کنید که چه موقع فوراً برگردد.• جهت پیگیری بیماری ۵ روز بعد مراجعه کند.		<p>• نشانه های کم آبی ندارد.</p>

اسهال پاییدار

- در صورت وجود علوفت اختصاصی (ماتنده پنومونی، سیستیک، علوفت ادراری، برفک و علوفت گوش میانی و...) درمان بیماری اولیه طبق استراتژی مانا صورت گیرد.
- در صورت وجود علوفت روده‌ای (ماتنده شیگلوز) درمان علوفت روده انجام شود.
- مقادیر مناسب مایعات جهت پیشگیری از کم آبی تغذیه

• بر تفاوتم تغذیه تأکید گنید.

- در سن کمتر از ۶ ماه، تغذیه انحصاری یا شیر مادر
- برای کودک بالای ۶ ماه غذای جامد و مناسب سن با کالری مناسب داده شود.
- رژیم مقداری و مقوی که باعث تشدید اسهال نگردد.
- مکمل روی را روزانه ۱۰ میلی‌گرم در سنین بالاتر) به مدت ۱۰ تا ۱۲ روز تجویز گنید.
- مولتی ویتامین + میترال دو برابر جیره توصیه شده، روزانه به مدت ۱۵ روز
- به مادر توصیه شود ۵ روز بعد جهت پیشگیری مراجعته نمایند.

وجود
خون
در
مدفعه

در صورت درد ایزوویک شکم به همراه خون در مدفعه	نوایناسیون	اقدامات قبل از انتقال رانجام داده و کودک را انتقال دهید	وجود خون در مدفعه
<ul style="list-style-type: none">• اقدامات درمانی را طبق طبقه بندی کم آبی شروع کنید.• توصیه های تغذیه ای، ارزیابی واکسیناسیون و مکمل های دارویی انجام شود.• به مادر توصیه کنید که چه موقع فوراً برگردد.• جهت پیگیری بیماری ۲ روز بعد مراجعته نماید.	اسهال خونی	<ul style="list-style-type: none">• خون در مدفعه	

درمان

اسهال خونی

- سفیکسیم ۸mg/kg/day در دو دوز منقسم برای مدت ۵ روز
- در صورت عدم پاسخ به درمان، سیپر AFLوكسازین خوراکی ۱۵mg/kg/dose دو توبت در روز برای ۲ روز تجویز شود.
- درمان حمایتی شامل پیشگیری و اصلاح کم آبی و ادامه تعذیه می باشد.

اسهال وباي

- تأمین آب و الکترولیت، مهم ترین جزء درمان است.
- به کودک برابر دستورالعمل کشوری آنتی بیوتیک مناسب بدهید،
براساس آخرین دستورالعمل کشوری، درمان بیماری وبا و با ملاحظه الگوهای مقاومت میکروبی،
آنکه بیوتیک توصیه شده برای کودکان عبارت است از:
- آزیتروماکسین (۲۰mg/kg/single dose) و یا سیپروفلوكسازین (۱۵mg/kg/dose) برای ۲ توبت در روز
برای ۳ روز می باشد.

اسهال

- اسهال خونی / بعد از ۲ روز
- کودک را زنظر کم آبی طبق چارت ارزیابی و طبقه بندی اسهال ارزیابی نموده و سؤال کنید،
- آیا دفعات دفع مدفعه کمتر شده است؟
 - آیا خون در مدفعه کمتر شده است؟
 - آیا تپ کمتر شده است؟
 - آیا درد شکم کمتر شده است؟

۲۸

- اسهال حاد (کم آبی نسبی) / در صورت عدم بهبودی، بعد از ۵ روز
- اسهال حاد (کم آبی ندارد) / در صورت عدم بهبودی، بعد از ۵ روز
- اسهال پایدار / بعد از ۵ روز
 - کودک را زنظر کم آبی ارزیابی نموده و سؤال کنید،
 - آیا اسهال قطع شده است؟
 - چند بار در روز دفع مدفعه شل داشته است؟

درمان

اگر اسهال هنوز متوقف نشده است (هنوز ۲ بار و بیشتر در روز مدفعه شل دارد) کودک را کامل ارزیابی کنید، در صورت وجود کم آبی آن را درمان کنید، مطابق توصیه های تغذیه ای اقدام کنید، برای ارزیابی بیشتر ارجاع دهید.

- در کودکانی که با شیر مصنوعی تغذیه می شوند، پس از ۵ روز رعایت توصیه های تغذیه ای و عدم بهبودی اسهال، در صورت وجود علائم کمبود لاکتوز (وجود اسهال حجمی و آبکی، نفخ، تهوع و استفراغ و سوختگی ناحیه کهنه کودک) شیر فاقد لاکتوز تجویز و ۲ روز بعد مجدداً پیگیری شود. در صورت عدم بهبودی ارجاع شود و در صورت بهبودی ۲ هفته دیگر شیر فاقد لاکتوز ادامه یابد.
- اگر اسهال متوقف شده است (کمتر از ۲ بار اسهال در روز دارد) به مادر بگویید توصیه های تغذیه ای معمول برای سن کودک را ادامه بدهد.

تب

- تب با کاهش اشتها و افزایش متابولیسم بدن در روند تغذیه کودک اختلال ایجاد می‌کند. در این موقع توصیه‌های زیر مفید است:
- در شیرخواران کمتر از ۶ ماه، تداوم تغذیه با شیر مادر و یا شیر مصنوعی (در شیرخواران محروم از شیر مادر)
- تداوم تغذیه با شیر مادر همراه با غذاهای مایع در کودکان بالای ۶ ماه
- افزایش تعداد دفعات تغذیه حتی با حجم کم جهت جبران کاهش اشتها کودک
- معنی شود غذادادن به کودک در زمانی انجام شود که تب کودک به واسطه داروهای تب بر کاهش نسبی یافته است.
- توجه به تغذیه بعد از بیماری جهت جبران عقب افتادگی‌های احتمالی رشد

اسهال حاد

- در تغذیه انحصاری با شیر مادر، تغذیه با شیر مادر به دفعات بیشتر و مدت طولانی‌تر در هر نوبت ادامه باید.
- در شیرخواران کمتر از ۶ ماه که تغذیه انحصاری ندارند، دفعات تغذیه با شیر مادر افزایش باید و ترجیحاً شیرخوار به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه شود.
- اگر کودک شیر مادر خوار نیست، علاوه بر شیر مصنوعی به او آب جوشیده خنک یا آر.آس هم بدهد.
- در صورت شروع تغذیه کمکی برای کودک، غذاهای آبکی (امانند سوپ و دوغ) داده شود.
- از مایعات خیلی شیرین مثل نوشابه و آب میوه های صنعتی استفاده نشود.
- برعحسب سن کودک هر مقدار مایعی که کودک بخواهد تا زمانی که اسهال متوقف گردد، به او بدهد.
- به کودک بیش از معمول مایعات (علاوه بر آر.آس مایعاتی تغذیر سوپ ساده، دوغ و آب) داده شود.
- در کودکان بالاتر از ۶ ماه مصرف غذاهایی مانند ماست، تخم مرغ، لفلاط و گوشت و مرغ و همچنین میوه‌ها و سبزی ها توصیه می‌شود.
- در صورت مشاهده استفراغ بعد از خوردن او آر.آس و یا غذاهای مایع، باید به کودک آهسته ترو در حجم کمتر و دفعات بیشتر داد.

توصیه‌های تغذیه‌ای در بیماری**اگر کودک خوب رشد نمی‌کند:**

- اگر شیرخوار کمتر از ۶ ماه سن دارد:
- اهمیت تغذیه منظم کودک در فواصل ۲ یا ۳ ساعت یک بار و به ویژه در هنگام شب را باید آور شوید که حتی اگر شیرخوار در سراسعت مشخص خوابیده باشد، باید او را بیدار نموده و تغذیه کند.
- تأکید کنید که مکیدن صحیح و مکرر پستان و تخلیه مرتب آن توسط شیرخوار و همچنین تغذیه متعادل مادر بپترین راه جبران عقب ماندگی رشد شیرخوار است.
- دفعات و مدت زمان شیردهی افزایش باید و در فواصل تغذیه شیرخوار برای افزایش شیر، مادر شیر خود را بدوشد.
- در صورتی که شیرخوار با شیر مصنوعی تغذیه می‌شود، نحوه تهیه و ارائه آن بررسی و آموزش داده شود.

اگر کودک بالای ۶ ماه سن دارد:

- نوع غذاهای کمکی مورد استفاده، نحوه تهیه آنها، زمان و دفعات معمول ارائه آن را با توجه به توصیه‌های تغذیه‌ای این کودکان آشورش دهید.
 - استفاده از میان وعده‌های مقوی و مقدی مانند فرنی، حریره بادام، یوره سیب زمینی، نان و پنیر و... مناسب با سن کودک تأکید شود.
 - مادر را با نحوه مقوی و مقدی کردن غذای کودک آشنا کنید.
 - تأکید کنید که ساعات صرف غذای کودک نباید محدود به ساعات صرف غذای خانوار شود.
- اگر کودک در طول بیماری خوب غذا نمی‌خورد با مادر مشاوره کنید**
- قبل از ازدادن غذا به کودک دست ها و صورت او شسته شود تا کودک احساس آرامش بیشتری کند.
 - در حالتی که کودک خواب آلود است به او غذا داده نشود.
 - تداوم شیردهی در کودکان شیرخوار تأکید می‌شود.
 - غذا به دفعات بیشتر و با حجم کمتر به کودک داده شود و از غذاهایی که کودک بیشتر دوست دارد استفاده بیشتری شود.
 - در صورت گرفتگی بینی ابتدا بینی را تمیز کرده و بعد غذا داده شود.

سرفه، سرماخوردگی، عفونت حاد تنفسی

- دقفات تنفسیه با شیر مادر بیشتر شود.
- به کودکان بزرگتر از ۶ ماه غذاهایی داده شود که تسبیت به حجم آن از بالاترین میزان کالری و موادغذایی برخوردار باشد.
- مایعات غذایی گرم نظیر سوب به کودکان مبتلا به سرماخوردگی و سرفه داده شود.
- از منابع غذایی حاوی ویتامین C (میوه‌ها و سبزی‌های تازه) جهت تقویت سیستم ایمنی کودک استفاده شود.
- در کودکان بالای یک سال، دادن مقداری عسل با چای و لرم به بهبود کودک دچار سرفه، سرماخوردگی یا عفونت تنفسی کمک می‌کند.

اسهال پایدار

- هدف از تعذیب در اسهال پایدار دریافت حداقل ۱۱ کالری به ازای هر کیلوگرم وزن در روز می‌باشد.
- مصرف ماست افزایش پاید و در کودکان بالای ۲ سال مصرف ماست، جایگزین شیر شود.
- کودکان بالای ۶ ماه روزانه با هش و معده غذاهای شوند و در برنامه غذایی کودک گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ گنجانده شود.
- برای اطمینان از دریافت ویتامین‌ها و املال، توصیه می‌شود در طبخ سوب از انواع سبزی‌ها و صیفی جات زرد و سبز استفاده شود.
- دریافت بیشتر منابع غذایی حاوی اسید فولیک (سبزی‌های برگ سبز)، آهن و روی (گوشت‌ها، تخم مرغ و حیوانات) و مکمل روی (۱۰ mg در سن کمتر از ۶ ماه و ۲۰ mg در سن بیشتر از ۶ ماه) و قولات (۵۰ میکروگرم) روزانه و حداقل به مدت ۲ هفته و تداوم مکمل ویتامین به صورت روتین توصیه می‌شود.

اگر کودک غیر از شیر مادر، شیر دیگری استفاده می‌کند:

الف- سن کمتر از ۶ ماه
تعذیب انحصاری با شیر مادر و قطع شیر دام

ب- سن بیشتر از ۶ ماه

- جایگزین کردن با شیر مادر و قطع شیر دام
- جایگزین کردن با فرآورده‌های شیر ماتنده ماست (در صورت عدم امکان، حداقل ۵۰۰ ml/day شیر حیوانی داده شود، یا جایگزین کردن نصف شیر با غذاهای نیمه جامد و غلات غنی شده).
- در صورت استفاده از شیر مصنوعی، شیر با فلکت همیشگی تهیه شود و آب جوشیده خنک یا او. آر. اس هم بدهد. پس از ۵ روز رهایت توصیه‌های تعذیب‌ای در صورت وجود علائم کمبود لاکتاز (وجود اسهال حجیم و آبکی، نفخ، تهوع و استفراغ و سوختگی تاحیه کهنه کودک) شیر فاقد لاکتوز تجویز و ۲ روز بعد بیگیری شود. در صورت عدم بهبودی به بیمارستان ارجاع و در صورت بهبودی ۲ هفته دیگر شیر فاقد لاکتوز ادامه باید.

به مادر توصیه کنید اگر کودک هریک از نشانه های زیر را داشت، باید فوراً برگرداد:

<ul style="list-style-type: none"> • قادر به نوشیدن یا خوردن شیر مادر نیست. • بیماری او شدیدتر شده است. • تب کند. 	<p>کودکی که مبتلا به هر بیماری است باید فوراً برگرداد اگر:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تنفس تند دارد. • تنفس مشکل دارد. 	<p>کودکی که پنومونی ندارد و دچار سرفه یا سرماخوردگی است، باید فوراً برگرداد اگر:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • دچار بی حالی، خواب آلودگی، بی قراری یا تحریک پذیری شود. • اسهال کودک شدیدتر شود. 	<p>هر کودک مبتلا به اسهال، باید فوراً برگرداد اگر:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • قادر به نوشیدن مایعات و یا خوردن غذا نباشد. • تب کند. • خون در مدفعه دیده شود. • استفراغ مکرر داشته باشد. • تشنجی زیاد داشته باشد. 	

چه موقع مراجعت کنند؟

به مادر توصیه کنید برای هریک از بیماری ها، براساس جدول چه زمانی برای ارزیابی مجدد برگرداد:

۳ روز بعد	در صورت عدم بهبودی	گلودرد
۲ روز بعد		تب
۵ روز بعد	در صورت عدم بهبودی ۲ روز بعد	پنومونی اسهال خوتی
۵ روز بعد	در صورت عدم بهبودی ۵ روز بعد	اسهال پایدار علوونت حاد گوش میانی علوونت مزمن گوش میانی
۵ روز بعد	در صورت عدم بهبودی	اسهال حاد (کم آبی تسبی) اسهال حاد (کم آبی ندارد) سرفه یا سرماخوردگی
۱۰ روز بعد (زیر ۲ ماه)		
۱۵ روز بعد (۲ ماه تا یک سال)		
۳۰ روز بعد (بالای یک سال)		کم وزنی و احتمال مشکل وزن



MEHR NEWSAGEN
Foto: Alireza Mohammadi